

El 70 % de les dones amb asimetria mamària presenta mames tuberoses

Redacció | Dissabte, 24 de desembre de 2016, 09:06

ARXIU EN | asimetria mamària mames tuberoses SCCPRE



La major part de les dones té una **asimetria mamària lleu**. Quan la asimetria és important, el 70 % d'aquest col·lectiu presenta **mames tuberoses**, una anomalia estètica que afecta la forma i mida de la mama i que desencadena, freqüentment, problemes psicològics. A causa del gran desconeixement d'aquest trastorn entre la població i de les repercussions emocionals que té en la salut de les pacients, la **Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE)** alerta de la necessitat que la persona afectada s'adreci a un professional especialitzat, que serà qui li podrà fer una correcta avaluació i tractament.

La mama tuberosa és una **malformació congènita** que es caracteritza per la presència d'un anell fibrós o banda de constricció a la base de la mama, que provoca que aquesta s'hernii o expulsi la glàndula cap a l'exterior. Per aquest motiu, aquestes mames es troben **més separades del normal**, tenen un pol inferior curt, una morfologia tubular i una arèola de grans dimensions.

Les mames tuberoses presenten diferents **graus de deformitat**, per la qual cosa, és crucial que l'especialista faci una avaluació exhaustiva de cada cas i utilitzi els procediments quirúrgics adients per corregir la glàndula mamària. “Un **mal diagnòstic preoperatori** o una cirurgia amb un remodelatge insuficient de la glàndula donen lloc a resultats estètics que accentuen el grau de deformitat o de asimetria inicial i que generen insatisfacció en les pacients”, explica **Anna López**, vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.

Així, entre els problemes derivats d'un mal tractament de les mames tuberoses, per exemple, pel fet de només col·locar una pròtesi darrere de la mama deformada, sense tractar la glàndula mamària, es troben el doble contorn o **plegament en el pol inferior** de la mama (doble bombolla) o el desplaçament de l'implant mamari cap a dalt.

IMPACTE PSICOLÒGIC

Aquesta malformació es produeix durant el creixement de la mama, és a dir, **a la pubertat** i, per tant, té un gran impacte en l'estabilitat emocional de la població adolescent. “Les mames tuberoses generen freqüentment complexes, inseguretats i baixa autoestima en les pacients”, indica la Dra. López.

La vicepresidenta de la **SCCPRE** afegeix que el **malestar psicològic** que pateixen moltes de les persones amb mames tuberoses té també una influència negativa a nivell social i disminueix la seva qualitat de vida. “L'elevat grau d'avergonyiment que poden arribar a tenir, les porta, sovint, a tancar-se en si mateixes, no demanar ajuda i a no ensenyar mai els pits, ni tan sols, a les seves pròpies mares”, explica.

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

La SCCPRE és una societat científica, membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que agrupa més d'un **centenar de cirurgians plàstics** de tot Catalunya que treballen tant en l'àmbit públic com privat.

MÉS INFORMACIÓ

Els experts alerten que només hi ha un desfibril·lador semiautomàtic cada 100.000 persones

Desenvolupen un test genètic per predir el risc d'infart

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica va ser l'entitat pionera a l'Estat espanyol en aquesta especialitat quirúrgica, l'any 1961, fruit de la unió d'un prestigiós grup de cirurgians catalans amb la inquietud de promoure aquesta especialitat mèdica i la formació continuada dels metges.

Amb la finalitat d'oferir la millor assistència als pacients i facilitar-los el màxim d'informació possible, la SCCPRE va pactar, l'any 2009, un **reglament amb el Departament de Salut** que obliga els cirurgians a especificar la seva especialitat en el document de consentiment que signen els pacients abans de sotmetre's a una operació de cirurgia estètica a Catalunya.